


VIH/SIDA



le VIH/sida est
la principale cause de décès
en Afrique subsaharienne et à l'échelle du monde,
il figure parmi les quatre principales causes de décès




Données du 15 mai 2003

En 2002, on estime à 2,4 millions le nombre de personnes ayant succombé à des causes liées au sida en Afrique subsaharienne. Même dans des pays à revenus élevés en Afrique du Nord, dans certaines régions d'Europe et en Australie, l'augmentation des taux d'infection suggère que les avancées réalisées en matière de traitements et de soins ne sont pas allées de pair avec des progrès en matière de prévention.

La sensibilisation, l'éducation, le diagnostic et le traitement du VIH/sida restent bas dans nombre de régions. Des études menées en Afrique subsaharienne ont montré que la moitié des adolescents interrogés ne comprenaient pas qu'une personne apparemment en bonne santé puisse vivre avec le VIH/sida. Des études menées en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes ont donné des résultats similaires.

En 2001, environ 14 millions d'enfants étaient devenus orphelins dans les pays en développement parce que leurs parents étaient morts du sida. On s'attend à ce que le nombre "d'orphelins du sida" double d'ici à 2010.

Pour faire pièce au développement rapide de l'épidémie, il faudra intensifier les efforts pour améliorer l'accès aux préservatifs et à des antirétroviraux bon marché, et lancer une grande campagne d'information et de sensibilisation à la maladie.



Données du 15 mai 2003

OBJECTIF 6
combattre le VIH/sida,
le paludisme et
d'autres maladies

POINT CENTRAL : CIBLE 7
stopper la propagation
du VIH/sida d'ici 2015
et commencer à inverser
la tendance actuelle